

种好冬桃的诀窍



张玉周给冬桃修枝

人物简介:张玉周,云南省西畴县莲花塘乡土生金林果专业合作社理事长。2006年,张玉周在莲花塘乡界牌村委会刺竹林村小组种植中华冬桃1200亩,2010年逐渐进入盛产期,年产鲜桃60多万公斤,销售额达300余万元。如今,他的冬桃园被文山农校确定为校外实习基地,被国家科技部、财政部列为“科普及惠农村”示范基地。

冬桃以春季开花,初冬果熟而得名。果味甘美,色佳香脆,营养丰富,具有益气血、生津液的保健功能。下面我谈谈怎样才能种植出果实饱满、色泽鲜艳、口感佳的冬桃。

种植前准备。冬桃种植对当地海拔、气候条件都有严格的要求。我的冬桃园位于西畴县莲花塘乡界牌村委会,当地海拔1312米,年平均气温 16.40°C ,年降水量1356.00毫米,属冷凉山区,各方面都能满足冬桃的生长条件。种植前首先要做好打塘工作,还要注意将混合均匀的营养土和农家肥放入塘中。苗木繁育应采用嫁接

法,砧木有山桃和毛桃,选择次年2月下旬种植时间较佳。

定植后管理。(1)修剪。从定植第二年开始,每年的12月进行修剪,去除旺枝、过密枝和病虫枝。(2)套袋。每年5月下旬对果实进行套袋。袋子最好用无菌专用袋。套袋前必须进行一次全面防治病虫害工作,喷药后一星期内套袋完毕,超过7天的应补喷一次。因为每年6月份后气温升高、雨水增多容易诱发各种病虫害发生,所以,套袋一定要及时提早完成。(3)拆袋。11月上旬为采收期,根据市场需求,要适时降温增湿,保持挂果时间。如果实10月底成熟,10月初就要开始拆袋,让果实自己进行光合作用,通过一段时间的光合作用,果实的品质和口感将更上一个档次。

摘桃后管理。桃树摘果以后,要及时采取以下措施管理。(1)整枝。剪除干枯枝、劈折枝;对于重迭枝、交叉枝的部分老弱枝组要适当回缩,疏除冠内过密枝、细弱枝及树冠上部挡风遮光的直立旺枝,以减少营养消耗,改善内膛光照条件。(2)松土。桃树采果后应立即中耕松土除草,一般锄深10~15厘米,要注意不使树干周围地面低洼,以防降雨或浇水时根颈部积水。(3)施肥。在采果后及时施肥,以增强树体的同化作用,补充树体的营养,充实新梢组织和花芽,增加树体贮藏营养水平。(3)覆草。果园覆草后可增加土壤有机质,保持土壤疏松,促进桃树生长发育。(4)浇水。有条件的果园,在土壤封冻前,要浇一次水,以保证桃树安全越冬。浇水量视当年干旱程度及树龄大小具体来定。

张玉周

栏目编辑 杨建乐